




Intracinol®

Acetónido de triamcinolona 4% Totalmente libre de conservantes Licencia para uso oftálmico



CAMBIO EN EL MÉTODO DE ADMINISTRACIÓN

LA TÉCNICA ESTRICTA ASÉPTICA ES OBLIGATORIA.

Intracinol debe ser administrado por un oftalmólogo calificado con experiencia en inyecciones intravítreas en condiciones asépticas.

NB. Debido a un cambio en el embalaje, el vial no se puede colocar en un campo estéril. La suspensión se puede extraer del vial **ASÉPTICAMENTE** utilizando una aguja de 27G.

► Licenciado para opacificar el vítreo durante la extirpación quirúrgica, incluso en pacientes con edema macular diabético, agujero macular y uveítis crónica.

Detalles del producto:

- ✓ Un frasco de 1ml de un solo uso en suspensión listo para usar
- ✓ Sin conservantes
- ✓ Disponible en Alloga - Código PIP 406-4754

Intracinol®

ACETONIDO DE TRIAMCINOLONA 40MG/ML

- Totalmente libre de conservantes y con licencia para uso oftálmico.
- Un frasco en suspensión de 1 ml de un solo uso.
- Se utiliza para opacificar el humor vítreo con el fin de facilitar su extirpación quirúrgica en pacientes con edema macular diabético, agujero macular o uveítis crónica.



INDICACIÓN	Triesence	Intracinol	Kenalog	Vitrealt S
Visualización durante la vitrectomía	✓	✓	X Contraindicado	✓
Rx de enfermedades oftálmicas	✓ solo EE. UU	X	X Contraindicado	X

COMPOSICIÓN	Triesence	Intracinol	Kenalog	Vitrealt S	FUNCIÓN
Acetónido de triamcinolona	✓	✓	✓	✓	Agente opacificante
Carmelosa sódica	✓	✓	✓	X	Agente de suspensión
Cloruro de sodio	✓	✓	✓	X	Agente isotónico
Polisorbato 80	✓	✓	✓	X	Agente tensioactivo
Cloruro de potasio	✓	✓	X	X	Agente isotónico
Cloruro de calcio	✓	✓	X	X	Agente isotónico
Cloruro de magnesio	✓	✓	X	X	Agente isotónico
Acetato de sodio	✓	✓	X	X	Agente tamponante
Citrato de sodio	✓	✓	X	X	Agente de suspensión
TS-polisacárido	X	✓	X	X	Agente de suspensión
Carbopol 980NF	X	X	X	✓	Agente gelificante
Trehalosa	X	X	X	✓	Agente de suspensión
Alcohol bencílico	X	X	✓	X	Agente conservante

Hay tres suspensiones de acetónido de triamcinolona sin conservantes disponibles y destinadas a uso oftálmico en Europa (UE): Triesence, Intracinol y Vitreal S.

Los tres productos tienen el propósito previsto de visualización durante la vitrectomía. Triesence también está autorizado para el tratamiento de afecciones inflamatorias oculares, pero SÓLO en los EE. UU., donde cuenta con la aprobación de la FDA. Alcon/Novartis no tiene autorización de comercialización para Triesence en el Reino Unido, por lo que actualmente las dos únicas opciones sin conservantes son Intracinol y Vitreal S.

Tanto Intracinol como Triesence tienen ingredientes similares (la única diferencia es el polisacárido TS, que es una sustancia protegida por patente de Farmigear). La formulación de Vitreal S es completamente diferente a la de Triesence e Intracinol. Como se muestra en la tabla anterior.

Fabricante: Sochim International S.r.l. - Italia.
Distribuidor Autorizado: ASG INVERSIONES E.I.R.L. RUC: 20509797766



Brochure elaborado exclusivamente para el mercado de Perú, conforme a la información técnica autorizada.

Material exclusivo para uso del profesional médico.

www.asgmedical.com.pe

Síguenos:    